

# ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย



## สาเหตุของโรคมาลาเรีย

โรคมาลาเรียเป็นโรคติดต่อเกิดจากเชื้อพลาสมาเดียม มีทั้งหมด 4 ชนิด คือ

พลาสมาเดียม พิลซิพารัม พลาสมาเดียม มาลารีอัส  
พลาสมาเดียม ไวกเวกซ์ พลาสมาเดียม โอวาล์

## การติดต่อของโรคมาลาเรีย

มียุงกินปล่องตัวเมียเป็นพาหะนำเชื้อจากผู้ป่วยมาลาเรีย ไปยังผู้อื่นโดยยุงกินปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียในต่อมน้ำลายกัดและปล่อยเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดคน



อาการของโรคมาลาเรียจะปรากฏหลังจากเชื้อมาลาเรียเข้าสู่ร่างกาย (เฉลี่ยแล้วใช้เวลา 10-14 วัน) มีอาการไม่สบาย ปวดศีรษะ มีไข้ ปวดเมื่อยตัว เพลีย เบื่ออาหาร

## ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงจากโรคมาลาเรีย

มาลาเรียขึ้นสมอง ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เหลืองซีด บัสสาวะดำ ไตล้มเหลว. ปอดบวมน้ำ ทำให้ผู้ป่วยตายได้



## การตรวจโรคมาลาเรีย

นอกจากอาการและอาการแสดงแล้ว ยังต้องตรวจหาเชื้อมาลาเรียในโลหิต โดยใช้การเจาะโลหิตที่ปลายนิ้วของผู้ป่วย นำมาย้อมสีและตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ด้วยกล้องจุลทรรศน์ หรือใช้ชุดตรวจสำเร็จรูป



ยุงกินปล่องอาศัยในป่าเขา สำธารน้ำใสไหลรินอาหารของโรคมาลาเรีย

## การป้องกันตนเองจากโรคมาลาเรีย

1. การนอนในมุ้งชุบน้ำยา มุ้งชุบน้ำยาไล่ยุงได้ไม่เพียงพอกับคน และห้ามชกมูอกกับพวงชกฟอกเพราะ: น้ำยาจะเสื่อมลง



2. การสวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้มิดชิด เช่น ใช้เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว



3. การใช้ยากากันยุงกัด



4. การใช้ยาจุดกันยุง



หากพบเชื้อจะให้การรักษาตามชนิดของเชื้อ ต้องกินยาให้ครบตามที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่นะจะ

